

サラジェン®を服用される方へ

現在、下に挙げる症状がある方は、このお薬を服用できません。
1つでも当てはまるものがございましたら、直ちに医師にご連絡ください。

該当する症状がございましたら、に✓印を付けてください。

心筋梗塞、
狭心症などの
重篤な
心臓の病気



気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患



消化管の閉塞



膀胱頸部の閉塞



パーキンソン症候群
パーキンソン病



虹彩炎



てんかん



心筋梗塞・狭心症の方へ

心筋梗塞や狭心症などの重篤な心臓の病気のある方は、
このお薬を服用できません。


心当たりのある方は、速やかに医師にご連絡ください。

どうして、このお薬を服用できないのか？

このお薬は、冠動脈^{れんしゆく}を攣縮（一過性に血管が収縮し、細くなること）させることがあります。冠動脈の攣縮は、狭心症や心筋梗塞の症状を悪化させるおそれがあるため、このお薬を服用いただけません。

冠動脈


生命活動に必要な酸素や栄養は、血液によって心臓から全身に送られています。心臓自身も、血液から酸素と栄養を受け取らないと働くことができません。心臓自身に血液を送っているのが、心臓を取り巻いている冠動脈です。



狭心症

冠動脈が、動脈硬化や攣縮によって一時的に狭くなり、十分に血液が心筋（心臓の筋肉）にいきわたらない状態を狭心症といいます。


正常な血管



心筋梗塞

冠動脈が非常に狭くなったり、血の塊が詰まったりすることによって、血液がいきわたらなくなり、心筋が壊死を起こした状態を心筋梗塞といいます。

動脈硬化



攣縮

