

サラジェン[®]錠5mg、顆粒0.5% を服用される患者さまへ

このお薬は、唾液を出しやすくすることで以下の症状を改善します。

- 口の中がかわく・べとべとする
- 口の中がかわいて話しにくい
- 食物を飲み込みにくい・食べにくい
- ノドがかわいて、よく眠れない



(錠剤)



(顆粒剤)

このお薬を服用するとき、次のことに注意してください。

1

**1回1錠または1包を
1日3回、食後30分以内に
水と一緒に飲みください。**

空腹時の服用は避けてください。



2

**飲み忘れた場合は、
次の食事の後に1回分だけ
お飲みください。**

飲み忘れたからといって、
次の服用時に2回分を同時に
飲まないようにしてください。



顆粒剤を服用される患者さまへ

お薬が口の中に付着する場合や飲み込むのがむずかしい場合は、少量の水にまぜてお飲みください。なお、まぜたものは保存しないでください。



このお薬を服用した後は、次のことに注意してください。

1

汗をかきやすくなります。

この症状はお薬の作用により現れます。
汗のかきすぎが気になる場合は医師・薬剤師にご相談ください。
大量の汗をかいたときは、十分な水分補給をこころがけてください。



2

鼻水が出る、下痢をする、トイレが近くなる、
頭が痛くなる、吐き気がするなどの
症状が出ることがあります。

これらの症状が出たときは
医師・薬剤師にご相談ください。



3

夜間の自動車の運転や、
暗所での危険を伴う作業などには
注意しましょう。
暗いところでは、
物が見えにくくなることがあります。



ほかにも、お薬を飲まれて、何か体調が変わったこと
がありましたら、医師・薬剤師にご相談ください。

