

くすりのしおり

内服剤

2021年03月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ジェノゲスト OD錠 1mg「キッセイ」

主成分：ジェノゲスト (Dienogest)

剤形：淡黄色の錠剤、直径 6.5mm、厚さ 3.1mm

シート記載：ジェノゲスト OD1mg「キッセイ」、子宮内膜症治療剤、DIENOGEST OD 1mg「KISSEI」、適正使用に関する情報、口腔内崩壊錠



この薬の作用と効果について

プロゲステロン受容体に対して選択的に作用を示し、卵巣機能抑制および子宮内膜細胞の増殖抑制により、子宮内膜症の症状および子宮腺筋症に伴う疼痛の改善効果を示すと考えられています。

通常、子宮内膜症の治療および子宮腺筋症に伴う疼痛の改善に使用されます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。診断のつかない異常性器出血がある。子宮がはれている、または貧血がある。子宮筋腫がある。
- ・妊娠、妊娠している可能性がある、授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、成人は1回1錠（主成分として1mg）を1日2回月経周期2～5日目から服用します。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・この薬は舌の上で唾液を含ませ舌で軽くつぶして、唾液で飲み込みます。普通の薬と同じように、コップ1杯の水またはぬるま湯で飲むこともできます。また、寝たままの状態では、水なしでは飲まないようにしてください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の服用時間が近い場合は忘れた分は飲まないで、次の服用時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲むではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- ・ホルモン性避妊薬以外の方法で避妊してください。
- ・本剤服用により不正出血がみられ、重い貧血がおこることがあります。その程度には個人差があり、服用中に出血が持続する場合や、一度に大量の出血が生じることもあるので、出血量が多く持続日数が長い場合や、一度に大量の出血がおこった場合には、医師へ相談してください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、不正出血、ほてり、頭痛、吐き気、不正出血の持続による外陰部のかぶれ・かゆみ、発疹、貧血、倦怠感などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・持続的あるいは多量の月経様の出血、全身倦怠感、めまい [不正出血、貧血]
- ・息苦しい、全身のかゆみを伴った発赤、眼および口の周囲の腫れ [アナフィラキシー]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。