

くすりのしおり

外用剤

2020年01月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ラタノプロスト点眼液 0.005%「キッセイ」

主成分：ラタノプロスト (Latanoprost)

剤形：無色澄明な点眼剤（2.5mL）

シート記載：ラタノプロスト点眼液 0.005%「キッセイ」、2.5mL



この薬の作用と効果について

房水流出経路からの流出を促進することにより、眼圧を下げます。
通常、緑内障、高眼圧症の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。無水晶体眼または眼内レンズ挿入眼である、眼内炎（虹彩炎、ぶどう膜炎）、ヘルペスウイルスが潜在している可能性がある、気管支喘息またはその既往歴がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、1回1滴を1日1回点眼します。必ず指示された使用方法に従ってください。
- ・手をよく洗い、容器の先端が直接目に触れないように注意して点眼してください。
- ・あふれた液は、清潔なガーゼやティッシュで拭き取ってください。
- ・他の点眼液も使用する場合には、5分間以上の間をあけてから点眼してください。
- ・コンタクトレンズをつけている場合には、レンズをはずしてから点眼し、15分以上経過してからレンズをつけてください。（コンタクトレンズが変色することがあります。）
- ・使い忘れた場合は、その日のうちであれば1回1滴を点眼してください。なお、翌日に点眼し忘れたことを気づいた場合も、1日2回点眼したり、1回に2滴点眼したりしないでください。
- ・誤って多く使用した場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で使うのを止めないでください。

生活上の注意

- ・点眼により、虹彩色素沈着があらわれ、徐々に増加し、中止により停止しますが、点眼した眼と他の眼で色調に差が生じる可能性がありますので、気がついた場合は医師に相談してください。
- ・点眼後、一時的に目がかすむことがありますので、症状が回復するまで自動車や機械の運転操作は避けてください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、結膜充血、眼刺激症状、かゆみ、眼痛、眼瞼（まぶた）色素沈着、眼瞼炎、かすみ目、まつ毛の異常（まつ毛が濃く、太く、長くなる）、視力低下、流涙などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・瞳の色に変化が見られる [虹彩色素沈着]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところに保管してください。
- ・開封前は、冷蔵庫（2～8℃）で保存してください。
- ・開封後は、点眼袋に入れておけば室温（1～30℃）で保存してもかまいません（冷蔵庫での保存も可能です）。
- ・凍結などにより結晶が析出する場合があります。万一結晶が析出している場合は使用しないでください。
- ・開封後4週間経過した場合は残液を使用しないでください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。