

# くすりのしおり

内服剤

2020年04月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

## 商品名：ミニリンメルト OD 錠 25 $\mu$ g

主成分：デスマプレシン酢酸塩水和物 (Desmopressin acetate hydrate)

剤形：白色の錠剤、直径 12mm、厚さ 3mm

シート記載：25、ミニリンメルト OD 錠 25 $\mu$ g



## この薬の作用と効果について

脳の下垂体から分泌されて尿量を調節する抗利尿ホルモン「バソプレシン」と同じような働きを持ちます。腎において水の再吸収を促して尿を濃縮することで、バソプレシン分泌不足が原因で大量の尿が出て夜間に何回もトイレに行くことを防ぐ錠剤です。

通常、男性における夜間多尿による夜間頻尿の治療に用いられます。

## 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。低ナトリウム血症またはその既往歴、習慣性または心因性多飲症、心不全またはその既往歴あるいは疑い、利尿薬による治療を要する体液貯留またはその既往歴、抗利尿ホルモン不適合症候群、腎機能障害
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、成人男性は1回2錠（デスマプレシンとして50 $\mu$ g）を1日1回就寝前に服用します。年齢、体重、血液中のナトリウム値、心機能などの状態により1回1錠（25 $\mu$ g）から服用を開始することもあります。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・この薬は舌の下に置くとすぐ溶けるので水なしで飲んでください。
- ・飲み忘れた場合は翌日から就寝前に飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

## 生活上の注意

- ・医師からの生活指導を守ってください。
- ・食事を含め、服用の2～3時間前より起床時迄の水分摂取は最小限としてください。医師の指示以上に水分を取りすぎた場合にはこの薬を使用しないでください。
- ・定期的に血液中のナトリウム濃度を調べます。指定された日時に検査を受けてください。
- ・配布された「ミニリンメルト OD 錠 25 $\mu$ g、50 $\mu$ g カード」を常に携帯し、医療機関を受診した際に、医師・薬剤師に提示してください。

## この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、頭痛、浮動性めまい、眠い、便秘、口内乾燥、下痢、手足や顔のむくみ、血圧上昇などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・倦怠感（体がだるい、疲れがとれない）、頭痛、吐き気、嘔吐など [低ナトリウム血症]
- ・足がむくむ、急に体重が増えた、疲れやすい、動くと息が苦しいなど [うっ血性心不全]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局や医療機関に相談してください。
- ・この薬は水分と光に不安定なので、乾いた手で飲む直前にシートから出してください。
- ・シートから取り出す際には、裏面のシートをはがした後、ゆっくりと指の腹で押し出してください。欠けたり割れたりした場合は全部飲んでください。

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

# くすりのしおり

内服剤

2020年04月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

## 商品名：ミニリンメルト OD錠 50 $\mu$ g

主成分：デスマプレシン酢酸塩水和物 (Desmopressin acetate hydrate)

剤形：白色の錠剤、直径 12mm、厚さ 3mm

シート記載：50、ミニリンメルト OD錠 50 $\mu$ g



## この薬の作用と効果について

脳の下垂体から分泌されて尿量を調節する抗利尿ホルモン「バソプレシン」と同じような働きを持ちます。腎において水の再吸収を促して尿を濃縮することで、バソプレシン分泌不足が原因で大量の尿が出て夜間に何回もトイレに行くことを防ぐ錠剤です。

通常、男性における夜間多尿による夜間頻尿の治療に用いられます。

## 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。低ナトリウム血症またはその既往歴、習慣性または心因性多飲症、心不全またはその既往歴あるいは疑い、利尿薬による治療を要する体液貯留またはその既往歴、抗利尿ホルモン不適合症候群、腎機能障害
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、成人男性は1回1錠（デスマプレシンとして50 $\mu$ g）を1日1回就寝前に服用します。年齢、体重、血液中のナトリウム値、心機能などの状態により1回25 $\mu$ gから服用を開始することもあります。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・この薬は舌の下に置くとすぐ溶けるので水なしで飲んでください。
- ・飲み忘れた場合は翌日から就寝前に飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

## 生活上の注意

- ・医師からの生活指導を守ってください。
- ・食事を含め、服用の2～3時間前より起床時迄の水分摂取は最小限としてください。医師の指示以上に水分を取りすぎた場合にはこの薬を使用しないでください。
- ・定期的に血液中のナトリウム濃度を調べます。指定された日時に検査を受けてください。
- ・配布された「ミニリンメルト OD錠 25 $\mu$ g、50 $\mu$ gカード」を常に携帯し、医療機関を受診した際に、医師・薬剤師に提示してください。

## この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、頭痛、浮動性めまい、眠い、便秘、口内乾燥、下痢、手足や顔のむくみ、血圧上昇などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・倦怠感（体がだるい、疲れがとれない）、頭痛、吐き気、嘔吐など [低ナトリウム血症]
- ・足がむくむ、急に体重が増えた、疲れやすい、動くと息が苦しいなど [うっ血性心不全]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局や医療機関に相談してください。
- ・この薬は水分と光に不安定なので、乾いた手で飲む直前にシートから出してください。
- ・シートから取り出す際には、裏面のシートをはがした後、ゆっくりと指の腹で押し出してください。欠けたり割れたりした場合は全部飲んでください。

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。