

くすりのしおり

内服剤

2015年05月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：シルデナフィル錠 25mgVI「キッセイ」

主成分：シルデナフィルクエン酸塩(Sildenafil citrate)

剤形：青色の錠剤、直径 7.1mm、厚さ 3.5mm

シート記載：シルデナフィル 25mgVI「キッセイ」、SF25、シルデナフィル VI、25mg、Sildenafil25mgVI「KISSEI」、25、ニトログリセリンなどの硝酸薬と本剤は併用できません



この薬の作用と効果について

陰茎海綿体の cGMP を増大させ、海綿体の弛緩反応を増強し、内圧を増強して勃起させます。

通常、勃起不全（満足な性行為を行うに十分な勃起とその維持が出来ない患者）に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビドなどの硝酸剤などで治療中。
- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。心血管系障害、肝機能障害、低血圧または高血圧、網膜色素変性症、鎌状赤血球性貧血、多発性骨髄腫、白血病、出血性疾患または消化性潰瘍、腎障害、多系統萎縮症（Shy-Drager 症候群など）である、陰茎に構造上の血管（屈曲しているなど）がある、最近 6 ヶ月以内に脳梗塞・脳出血や心筋梗塞をおこした。
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は<<< :医療担当者記入>>
- ・通常、成人は 1 回 1～2 錠（シルデナフィルとして 25～50mg）を性行為の約 1 時間前に服用します。高齢者（65 歳以上）や肝障害や重度の腎障害のある患者は 1 回 1 錠（25mg）から服用を開始します。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・食事とともに服用すると、効果に影響を与えることがあります。
- ・1 日 1 回服用し、次の服用は 24 時間以上あけてください。絶対に 2 回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- ・性行為は心臓に負担をかけます。無理をしないようにしましょう。また、性行為感染症を防ぐことはできません。
- ・めまいや視覚障害（色が変わって見えるなど）があらわれることがありますので、自動車や機械の運転操作をする場合には十分注意してください。
- ・急激な視力低下や視力喪失などの症状があらわれたら、服用をやめ、すぐに眼科を受診してください。
- ・パートナーに服用する（している）ことをお伝えください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、血管拡張（ほてり、潮紅）、頭痛、消化不良、動悸などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

くすりのしおり

内服剤

2015年05月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：シルデナフィル錠 50mgVI「キッセイ」

主成分：シルデナフィルクエン酸塩(Sildenafil citrate)

剤形：青色の錠剤、直径 9.1mm、厚さ 4.4mm

シート記載：シルデナフィル 50mgVI「キッセイ」、SF50、シルデナフィル VI、50mg、Sildenafil150mgVI「KISSEI」、50、ニトログリセリンなどの硝酸薬と本剤は併用できません



この薬の作用と効果について

陰茎海綿体の cGMP を増大させ、海綿体の弛緩反応を増強し、内圧を増強して勃起させます。

通常、勃起不全（満足な性行為を行うに十分な勃起とその維持が出来ない患者）に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビドなどの硝酸剤などで治療中。
- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。心血管系障害、肝機能障害、低血圧または高血圧、網膜色素変性症、鎌状赤血球性貧血、多発性骨髄腫、白血病、出血性疾患または消化性潰瘍、腎障害、多系統萎縮症（Shy-Drager 症候群など）である、陰茎に構造上の血管（屈曲しているなど）がある、最近 6 ヶ月以内に脳梗塞・脳出血や心筋梗塞をおこした。
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は<<< :医療担当者記入>>
- ・通常、成人は 1 回 1～2 錠（シルデナフィルとして 25～50mg）を性行為の約 1 時間前に服用します。高齢者（65 歳以上）や肝障害や重度の腎障害のある患者は 1 回 1 錠（25mg）から服用を開始します。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・食事とともに服用すると、効果に影響を与えることがあります。
- ・1 日 1 回服用し、次の服用は 24 時間以上あけてください。絶対に 2 回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- ・性行為は心臓に負担をかけます。無理をしないようにしましょう。また、性行為感染症を防ぐことはできません。
- ・めまいや視覚障害（色が変わって見えるなど）があらわれることがありますので、自動車や機械の運転操作をする場合には十分注意してください。
- ・急激な視力低下や視力喪失などの症状があらわれたら、服用をやめ、すぐに眼科を受診してください。
- ・パートナーに服用する（している）ことをお伝えください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、血管拡張（ほてり、潮紅）、頭痛、消化不良、動悸などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。