

くすりのしおり

注射剤

2021年08月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名:ウパシタ 静注透析用 25 μ g シリンジ

主成分:ウパシカルセトナトリウム水和物(Upacicalcet sodium hydrate)

剤形:注射剤

シート記載:



この薬の作用と効果について

副甲状腺細胞表面のカルシウム受容体に作用し、主として副甲状腺ホルモン（PTH）分泌を抑制することで血中PTH濃度や血中カルシウム濃度を低下させます。

通常、血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。低カルシウム血症がある。
- ・妊娠または妊娠している可能性がある、授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（ :医療担当者記入）
- ・通常、成人は、週3回、透析終了時の返血時に透析回路静脈側に注入します。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、吐き気、食欲減退、筋痙縮、水晶体混濁などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・しびれ、痙攣、気分不良、不整脈、血圧低下[低カルシウム血症] [胸痛、動悸、胸部不快感[QT延長]]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

くすりのしおり

注射剤

2021年08月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名:ウパシタ 静注透析用 50 μ g シリンジ

主成分:ウパシカルセトナトリウム水和物(Upacicalcet sodium hydrate)

剤形:注射剤

シート記載:



この薬の作用と効果について

副甲状腺細胞表面のカルシウム受容体に作用し、主として副甲状腺ホルモン（PTH）分泌を抑制することで血中PTH濃度や血中カルシウム濃度を低下させます。

通常、血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。低カルシウム血症がある。
- ・妊娠または妊娠している可能性がある、授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（ :医療担当者記入）
- ・通常、成人は、週3回、透析終了時の返血時に透析回路静脈側に注入します。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、吐き気、食欲減退、筋痙縮、水晶体混濁などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・しびれ、痙攣、気分不良、不整脈、血圧低下[低カルシウム血症] [胸痛、動悸、胸部不快感[QT延長]]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

くすりのしおり

注射剤

2021年08月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名:ウパシタ 静注透析用 100 μ g シリンジ

主成分:ウパシカルセトナトリウム水和物(Upacicalcet sodium hydrate)

剤形:注射剤

シート記載:



この薬の作用と効果について

副甲状腺細胞表面のカルシウム受容体に作用し、主として副甲状腺ホルモン（PTH）分泌を抑制することで血中PTH濃度や血中カルシウム濃度を低下させます。

通常、血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。低カルシウム血症がある。
- ・妊娠または妊娠している可能性がある、授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（ :医療担当者記入）
- ・通常、成人は、週3回、透析終了時の返血時に透析回路静脈側に注入します。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、吐き気、食欲減退、筋痙縮、水晶体混濁などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・しびれ、痙攣、気分不良、不整脈、血圧低下[低カルシウム血症] [胸痛、動悸、胸部不快感[QT延長]]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

くすりのしおり

注射剤

2021年08月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名:ウパシタ 静注透析用 150 μ g シリンジ

主成分:ウパシカルセトナトリウム水和物(Upacicalcet sodium hydrate)

剤形:注射剤

シート記載:



この薬の作用と効果について

副甲状腺細胞表面のカルシウム受容体に作用し、主として副甲状腺ホルモン（PTH）分泌を抑制することで血中PTH濃度や血中カルシウム濃度を低下させます。

通常、血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。低カルシウム血症がある。
- ・妊娠または妊娠している可能性がある、授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（ :医療担当者記入）
- ・通常、成人は、週3回、透析終了時の返血時に透析回路静脈側に注入します。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、吐き気、食欲減退、筋痙縮、水晶体混濁などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・しびれ、痙攣、気分不良、不整脈、血圧低下[低カルシウム血症] [胸痛、動悸、胸部不快感[QT延長]]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

くすりのしおり

注射剤

2021年08月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ウパシタ 静注透析用 200 μ g シリンジ

主成分：ウパシカルセトナトリウム水和物 (Upacicalcet sodium hydrate)

剤形：注射剤

シート記載：



この薬の作用と効果について

副甲状腺細胞表面のカルシウム受容体に作用し、主として副甲状腺ホルモン（PTH）分泌を抑制することで血中PTH濃度や血中カルシウム濃度を低下させます。

通常、血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。低カルシウム血症がある。
- ・妊娠または妊娠している可能性がある、授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、成人は、週3回、透析終了時の返血時に透析回路静脈側に注入します。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、吐き気、食欲減退、筋痙縮、水晶体混濁などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・しびれ、痙攣、気分不良、不整脈、血圧低下[低カルシウム血症] [胸痛、動悸、胸部不快感[QT延長]]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

くすりのしおり

注射剤

2021年08月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ウパシタ 静注透析用 250 μ g シリンジ

主成分：ウパシカルセトナトリウム水和物 (Upacicalcet sodium hydrate)

剤形：注射剤

シート記載：



この薬の作用と効果について

副甲状腺細胞表面のカルシウム受容体に作用し、主として副甲状腺ホルモン（PTH）分泌を抑制することで血中PTH濃度や血中カルシウム濃度を低下させます。

通常、血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。低カルシウム血症がある。
- ・妊娠または妊娠している可能性がある、授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、成人は、週3回、透析終了時の返血時に透析回路静脈側に注入します。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、吐き気、食欲減退、筋痙縮、水晶体混濁などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・しびれ、痙攣、気分不良、不整脈、血圧低下[低カルシウム血症] [胸痛、動悸、胸部不快感[QT延長]]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

くすりのしおり

注射剤

2021年08月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名:ウパシタ 静注透析用 300 μ g シリンジ

主成分:ウパシカルセトナトリウム水和物(Upacicalcet sodium hydrate)

剤形:注射剤

シート記載:



この薬の作用と効果について

副甲状腺細胞表面のカルシウム受容体に作用し、主として副甲状腺ホルモン（PTH）分泌を抑制することで血中PTH濃度や血中カルシウム濃度を低下させます。

通常、血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。低カルシウム血症がある。
- ・妊娠または妊娠している可能性がある、授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（ :医療担当者記入）
- ・通常、成人は、週3回、透析終了時の返血時に透析回路静脈側に注入します。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、吐き気、食欲減退、筋痙縮、水晶体混濁などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・しびれ、痙攣、気分不良、不整脈、血圧低下[低カルシウム血症] [胸痛、動悸、胸部不快感[QT延長]]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。