

くすりのしおり

注射剤

2012年07月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ウテメリン注 50mg

主成分：リトドリン塩酸塩 (Ritodrine Hydrochloride)

剤形：注射剤

シート記載：



この薬の作用と効果について

アドレナリンβ受容体刺激作用によるカルシウムイオン取り込み促進作用により、子宮の異常収縮を抑制します。

通常、緊急時の切迫流・早産の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。子宮出血、甲状腺機能亢進症、高血圧症、心疾患、糖尿病、肺高血圧症、筋緊張性（強直性）ジストロフィーなどの筋疾患がある。
- ・妊娠（妊娠16週未満）または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

・あなたの用法・用量は<<

：医療担当者記入>>

- ・通常、点滴で静脈内に注射します。
- ・心臓の負担を軽減するために、横向きの姿勢での使用が勧められます。
- ・症状を見ながら長期間使うことがあります。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、心悸亢進（動悸）、頻脈、手指振戦、顔面潮紅、吐き気、多形滲出性紅斑、腫脹、発疹、かゆみなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・呼吸困難、胸部圧迫感、咳嗽 [肺水腫、心不全]
- ・倦怠感、発熱、咽頭痛 [無顆粒球症などの血液障害]
- ・筋肉の痛み、力がぬける、尿が赤褐色になる [横紋筋融解症]
- ・激しい喉の渇き、多飲、多尿 [高血糖、糖尿病性ケトアシドーシス]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。