


## くすりのしおり

注射剤

2012年07月改訂

<p>薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。</p>	
<p><b>商品名:</b>ゾラデックス 1.8mg デポ <b>主成分:</b>ゴセレリン酢酸塩(Goserelin Acetate) <b>剤形:</b>注射剤 <b>シート記載:</b></p>	
<p><b>この薬の作用と効果について</b> 下垂体-性腺系機能抑制作用があり、性ホルモンの分泌を抑えます。 通常、子宮内膜症の治療に用いられます。</p>	
<p><b>次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。異常な性器出血がある、骨に病気がある、易出血状態である。</li><li>・妊娠または授乳中、妊娠している可能性がある</li><li>・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。</li></ul>	
<p><b>用法・用量（この薬の使い方）</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・あなたの用法・用量は&lt;&lt; &gt;&gt; :医療担当者記入&gt;&gt;</li><li>・通常、4週（28日）ごとに1回、前腹部の皮下に注射します。最初の注射は、月経中に行います。</li><li>・通常、6カ月間、使用します。</li><li>・この薬は1回の注射で4週間効果が持続します。必ず4週（28日）ごとに来院し、注射を受けるようにしてください。4週を超えると薬の効果が薄れ、一過性に症状が悪化するおそれがあります。</li><li>・注射をする前に、注射部位の痛みを軽減するため、局所麻酔をする場合があります。</li></ul>	
<p><b>生活上の注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・治療中は妊娠しないように、ホルモン剤以外の方法で避妊してください。</li><li>・骨塩量の減少を防ぐために、適度な運動とカルシウムの豊富な食事を心がけてください。</li></ul>	
<p><b>この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）</b> 主な副作用として、のぼせ・ほてり、肩こり、頭痛、性器出血などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。</p> <p><b>まれに下記のような症状があらわれ、[ ] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。</b> <b>このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・呼吸困難、蕁麻疹、冷汗 [アナフィラキシー]</li><li>・皮膚や白目が黄色くなる、全身倦怠感、食欲不振 [肝機能障害、黄疸]</li><li>・急激な前胸部の圧迫感、突然認める片側の手足や顔の麻痺、呼吸困難 [血栓塞栓症]</li></ul> <p><b>以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。</b></p>	
<p><b>保管方法 その他</b></p>	
<p><b>医療担当者記入欄</b></p>	<p>年 月 日</p>

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。