

くすりのしおり

内服剤
2014年12月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：サラジェン顆粒 0.5%

主成分：ピロカルピン塩酸塩(Pilocarpine hydrochloride)

剤形：白色～微黄白色の顆粒剤

シート記載：口腔乾燥症状改善薬、サラジェン顆粒 0.5%、5mg/1g 分包、
SALAGENGranules



この薬の作用と効果について

唾液腺のムスカリン M₃受容体に直接作用して唾液の分泌を促進させることにより、口の中の乾燥症状を改善し、しゃべりにくい、食べ物がのどを通りにくいなどの症状を改善します。

通常、頭頸部の放射線治療に伴う口腔乾燥症状、シェーグレン症候群患者の口腔乾燥症状の改善に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。心疾患、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患、胃腸・膀胱に閉塞、てんかん、パーキンソンズ病またはパーキンソン病、虹彩炎、唾液腺腫脹・疼痛、間質性肺炎、膵炎、過敏性腸疾患、消化性潰瘍、胆のう障害または胆石、結石（尿路、腎）、前立腺肥大、甲状腺機能亢進症がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は<< :医療担当者記入>>
- ・通常、成人は1回1包（主成分として5mg）を1日3回食後に服用します（空腹時を避け、食後30分以内とする）。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合、食後30分を過ぎて気づいたときは、その回の服用は避けて、次の服用時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- ・瞳孔が縮小して眼が見えにくくなることがあります。夜間の自動車の運転および暗いところでの危険を伴う機械の操作には十分にご注意ください。
- ・汗が過度に出ることがありますので、脱水症状を起こさないように水分補給にご留意ください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、多汗、鼻炎、下痢、頻尿、頭痛、ほてり、吐き気、寒気、嘔吐、めまい、腹痛、咳、倦怠感などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・発熱、咳・痰、呼吸困難 [間質性肺炎]
- ・気を失う、意識がなくなる [失神・意識喪失]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局や医療機関に相談してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。